

# GUÍA DE VACUNAS REQUERIDAS PARA LA INSCRIPCIÓN ESCOLAR EN ARIZONA

## Grados K-12



Requisitos por edad y grado para la inscripción y revisión continua para la asistencia escolar<sup>1</sup>. Las vacunas deben seguir los intervalos mínimos y edades para ser válidas. Se aplica un período de gracia de 4 días en la mayoría de las situaciones.

Edad	Número de dosis requeridas de cada inmunización				
Kindergarten-12º Grado	3 Hep B <sup>2</sup>	4 Polio <sup>3</sup>	2 MMR <sup>4</sup>	1 Varicella <sup>4</sup>	5 DTaP <sup>5</sup>
Requisitos adicionales a la edad de 11 años y mayores <sup>6</sup>				1 Tdap <sup>7</sup>	1 MenACWY

### Notas:

1. Estudiantes deben tener comprobante de todas las vacunas requeridas para asistir la escuela.
2. La dosis final de Hepatitis B (Hep B) debe administrarse a las 24 semanas de edad o más. Si la 3ª dosis se administró antes de las 24 semanas de edad, se requiere una 4ª dosis.
3. Se aceptan 3 dosis de polio si la 3ª dosis se recibió a los 4 años de edad y con un intervalo mínimo de 6 meses después de la 2ª dosis. Por lo contrario, 4 dosis son requeridas, con la última dosis recibida al cumplir 4 años de edad o después. Si la dosis final se administró EN o DESPUÉS de agosto 7 del 2009, la última dosis debe ser administrada con un mínimo de 4 años de edad Y un intervalo mínimo de 6 meses después de la dosis anterior. Estudiantes que recibieron 3 o 4 dosis válidas ANTES de agosto 7 del 2009 satisfacen el requisito.
4. La edad mínima para la 1ª dosis de MMR y varicela es de 12 meses. Otra dosis será requerida si la 1ª dosis de cualquier vacuna se administró más de 4 días antes del 1º cumpleaños. MMR y varicela deben administrarse el mismo día o con al menos 28 días de diferencia.
5. Se aceptan 4 dosis de Dtap si la última dosis se recibió a los 4 años de edad o después. Se requiere una 6ª dosis si se administraron 5 dosis antes de los 4 años de edad, y si el niño/a es menor de 7 años. Para niños de 7 a 10 años de edad, 3 dosis de DTAP, DTP, DT, Tdap o TD son aceptables si todas las 3 dosis se administraron después del 11º cumpleaños.
6. Adicionalmente de las vacunas requeridas para todos los estudiantes de K-12, se requiere 1 dosis de Tdap y 1 dosis de la vacuna meningococo cuadrivalente (MenACWY) cuando el estudiante cumpla 11 años, independiente del grado. Se recomienda que notifique a los padres antes que el niño/a cumpla 11 años, estas vacunas se deben recibir una vez que cumplan los 11 años. NO requieren ni recomiendan las vacunas de Tdap y MenACWY ANTES de la edad de 11 años. No hay un periodo de tiempo definido por el estatuto en cual los estudiantes deben ingresar cumplimiento con el requisito, pero ADHS *recomienda* no más de 15 días después del 11º cumpleaños.
7. Estudiantes deben de tener un mínimo 3 dosis de la vacuna contra el tétanos/difteria, incluyendo al menos 1 dosis de Tdap. Si se administró una vacuna que contiene tétanos entre las edades de 7 a 10 años, se requiere 1 dosis de Tdap cuando hayan transcurrido al menos 5 años desde la última dosis de la vacuna que contiene tétanos.

Consulte la página siguiente para obtener información adicional y excepciones y condiciones a las reglas.

Arizona Immunization Program Office • 150 North 18th Avenue, Suite 120  
Phoenix, AZ 85007 • (602) 364-3630

Última Revisión: agosto 2019

# GUÍA DE VACUNAS REQUERIDAS PARA LA INSCRIPCIÓN ESCOLAR EN ARIZONA

## GRADOS K-12

Las leyes y normas que rigen los requisitos de vacunación escolar son los Estatutos Revisados de Arizona §15-871-874; y el Código Administrativo R9-6-701-708. Por favor revise los requisitos de la escuela en la Tabla 7.1 y el horario de “ponerse al día” en la Tabla 7.2, ubicada en R9-6-701-708.

Estudiantes deben tener comprobante de todas las vacunas requeridas para asistir la escuela. Sin embargo, la ley de Arizona Permite exenciones para K-12 por razones médicas, pruebas de inmunidad de laboratorio y creencias personales. Para más información y orientación, consulte el [Manual de vacunación de Arizona para escuelas y programas de cuidado infantil](#) junto con [Preguntas Frecuentes](#).

No se acepta el recuerdo de los padres o el historial verbal de cualquier enfermedad; por lo tanto, estos estudiantes deben presentar un formulario de exención médica de ADHS. **Específicamente para la varicela, el sarampión o rubéola, se requiere una exención médica con evidencia de inmunidad de laboratorio adjunta.**

Los estudiantes sin hogar y los niños en cuidado de crianza tienen un periodo de gracia de 5 días para presentar comprobantes de los registros de vacunación (suponiendo que todos los demás estudiantes tengan sus registros de vacunación presentados antes de asistir la escuela).

### HORARIO DE “PONERSE AL DIA” E INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS REQUISITOS DE VACUNAS:

- **Hepatitis B (HepB):** Los intervalos mínimos para dosis válidas son las siguientes: La 2ª dosis se debe recibir al menos de 4 semanas después de la 1ª dosis; la 3ª dosis se debe recibir al menos 8 semanas después de la 2ª dosis y al menos de 16 semanas después de la 1ª dosis. La dosis final de la vacuna contra HepB (VHB) debe ser a las 24 semanas de edad o después. Si se administró la 3ª dosis de HepB antes de las 24 semanas de edad, se necesita una 4ª dosis.
- **Hep B para estudiantes de 11 a 15 años:** 2 dosis cumplen el requisito si se recibió la vacuna contra HepB para adultos (Recombivax). La dosis (10mcg/1.0mL) y el tipo de vacuna utilizada deben estar claramente documentada. Si Recombivax no fue la vacuna utilizada, se requiere una serie de 3 dosis.
- **Vacuna meningocócica:** solo se aceptarán dosis cuadrivalentes de la vacuna ACWY meningocócica. Las únicas vacunas meningocócicas cuadrivalentes administradas actualmente in los EE. UU. son Menactra y Menveo. La vacuna contra el polisacárido meningocócico (Menomune) es una vacuna cuadrivalente y es aceptable, sin embargo, la producción de esta vacuna se suspendió en febrero del 2017. Los estudiantes que recibieron esta vacuna de polisacárido se consideran que satisfacen el requisito. No se aceptarán vacunas meningocócicas monovalentes o bivalentes (MenA, MenB, MenC o MenC/Y).
- **Poliomielitis (Polio):** La 2ª dosis se debe recibir 4 semanas después se la 1ª dosis; la 3ª dosis se debe recibir 6 meses después de la 2ª dosis. Actualmente, los EE. UU. solo da la vacuna IPV (vacuna inactivada contra la poliomielitis) mientras que algunos países extranjeros todavía administran la OPV (vacuna oral contra la poliomielitis). La OPV dada antes de abril 1 del 2016 se supone ser trivalente y por lo tanto aceptable, independientemente del país de administración. Se presume que cualquier dosis de OPV administrada después de abril 1 del 2016 es bivalente y por lo tanto inaceptable. Los estudiantes mayores de 18 años están exentos del requisito de poliomielitis.
- **MMR:** La 2ª dosis se debe recibir 4 semanas después de la 1ª dosis.
- **Varicela:** Se **requieren** 2 dosis para los estudiantes que reciben la 1ª dosis a los 13 años de edad o más. Se *recomienda* 2 dosis para todos los estudiantes de K-12.

